

BROMESCIN®

capsule e gel



Confezione: 20 capsule da 500 mg

Modo d'uso: **2 capsule al dì lontano dai pasti**

Tubo 150 ml

Modo d'uso: si consiglia di applicare il prodotto sulla zona da trattare una o due volte al giorno, massaggiando delicatamente fino a

Bibliografia:

Singh GB, Atal CK. Pharmacology of an extract of salai guggal ex-Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions, 18:407-12, 1986

Safayhi H, Mack T, Sabieraj J, Anazodo MI, Subramanian LR, Ammon HP. Boswellic acids: novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. J Pharmacol Exp Ther, 261(3):1143-6, 1992

Greenfield SM, Punchard NA, Teare JP, Thompson RP. Review article: the mode of action of the aminosaliclates in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther, 7(4):369-83, 1993

Hoernlein RF, Orlikowsky T, Zehrer C, Niethammer D, Sailer ER, Simmet T, Dannecker GE, Ammon HP. Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid induces apoptosis in HL-60 and CCRF-CEM cells and inhibits topoisomerase I. J Pharmacol Exp Ther, 288(2):613-9, 1999

P. G. Petta et al. HPLC of B-Escin 1999 - 478

Anthony J. Cichoke: "The complete book of enzyme therapy" - Avery Penguin Putnam Inc. (1999)

Dickson S, Gallagher J, McIntyre L, Suter A, Tan J. An open study to assess the safety and efficacy of Aesculus hippocastanum tablets (Aesculaforce50 mg) in the treatment of chronic venous insufficiency. J Herbal Pharmacother. 2004;4:19-32

Strada G. Impiego in urologia di nuovo enzima proteolitico. Rassegna di Urologia e Nefrologia 1983; 21:101-8.

Surrey ES. The role of progestins in treating the pain of endometriosis. J Minim Invasive Gynecol 2006; 13:528-34.

Flogosi - Edema


...un problema spesso presente
in varie patologie...



BROMESCIN®
capsule e gel

La risoluzione del problema!!!

MECCANISMO DEL PROCESSO INFIAMMATOIO



BROMESCIN[®] per il dosaggio e la sinergia dei suoi componenti è in grado di intervenire prontamente ai vari livelli del processo flogo-edematoso.

BROMESCIN[®] è un preparato che aiuta a contrastare i processi flogistici con Edema conseguenti a:

- Interventi chirurgici di varia natura
- Interventi di tipo ginecologico e urologico
- Manovre endoscopiche e artroscopiche
- Chirurgia vascolare ed ortopedica
- Chirurgia plastica, oculistica, maxillo facciale
- Flebologia e traumatologia

BROMESCIN[®]
capsule

Non provoca Gastrolesività

BROMESCIN[®]
gel

NON CONTIENE ALCOOL