

TOCOLISIN®

NEL CONTRASTO ALLA MINACCIA DI ABORTO
E NELLA PREVENZIONE DEL PARTO PRE TERMINE



Indicazioni: coadiuvante nella minaccia di aborto e nella prevenzione del parto pre-termine.
Coadiuvante nel mantenimento della fase di quiescenza uterina in gravidanza.

Posologia: si consiglia l'assunzione di una bustina al giorno, sciolta in acqua, dopo il pasto principale, il prodotto può essere utilizzato fino alla 33° settimana o secondo parere medico.

Bibliografia

Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Roberson L et al. British Journal of hematology. 2006

The risk of pregnancy-associated recurrent venous thromboembolism in pregnancy and puerperium without antithrombotic prophylaxis. De Stefano V, Martinelli et al. BrJ Ha emathol 2006 - 135(3).

Antiplatelet agents for preventing pre-eclampsia and its complications. Duley L, Memers et al. Database Syst 2007 April.

Aspirin and prevention of vascular complications. Uzans et al. Obstet Gynecol 2000.

Magnesium in preterm labor. Keirse, Renfrew, Neilson. AH Publication 2001.

Magnesium supplementation in pregnancy. Makrides, Crowther. Cochrane Database Syst Rev 2001.

Vitamin C supplementation in pregnancy. Rumbold A., Crowther CA, Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18

Serum vitamin C and the prevalence of vitamin C deficiency in the United States: 2003-2004 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Schleicher RL, Carroll MD, Ford ES, Lacher DA. Am J Clin Nutr. 2009 Nov; 90(5):1252-63. doi: 10.3945/ajcn.2008.27016. Epub 2009 Aug 12.

Expression of stretch-activated two-pore potassium channels in human myometrium in pregnancy and labor. Buxton IL, Singer CA, Tichenor JN. PLoS One. 2010 Aug 25;5(8):e12372. doi: 10.1371/journal.pone.0012372.

